AVES DE JARDÍN

Guía ilustrada de aves de jardín

VISIT…

a. A través de su canto los pájaros
comunican una comunicación
en la que dicen que no dicen nada.

b. El lenguaje de los pájaros
es un lenguaje de signos transparentes
en busca de la transparencia dispersa de algún significado.

c. Los pájaros encierran el significado de su propio canto
en la malla de un lenguaje vacío;
malla que es a un tiempo transparente e irrompible.

d. Incluso el silencio que se produce entre cada canto
es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento
del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma.

e. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros
ni su equivalente, la palabra humana, sino el silencio,
el que convertido en mensaje tiene por objeto
establecer, prolongar o interrumpir la comunicación
para verificar si el circuito funciona
y si realmente los pájaros se comunican entre ellos
a través de los oídos de los hombres
y sin que estos se den cuenta.

NOTA:
Los pájaros cantan en pajarístico,
pero los escuchamos en español.
(El español es una lengua opaca,
con un gran número de palabras fantasmas;
el pajarístico es una lengua transparente y sin palabras).

Juan Luis Martinez

© 2014

Recopilación e ilustraciones:
Claudia Ortiz Robles

Colaboradores:
Amanda Covarrubias
Simón covarrubias
Jesús Covarrubias

Editorial Ilustraverde
Viña del mar- Quilpué, Chile

Referencias:
www.avesdechile.cl
www.unorch.cl
www.avesvivenchile.blogspot.com

Contacto: facebook/ilustraverde



Esta nueva edición de aves de jardín en formato libro ha sido construida con la intención de tener un objeto más duradero y de consulta en casa o en terreno, para todos los amantes de la naturaleza.

A través de estas páginas podrás conocer a los amiguitos que se encuentran afuera cantando con su lenguaje transparente.

Cuando estés sentado en tu jardín, mirando el cielo, los árboles y las flores, ¡cuenta, identifica y nombra!. Hay tantas aves en nuestra tierra que nos acompañan siempre con su hermosa melodía, sus colores, y su presencia invisible. Aquí te contamos cómo se llaman para que puedas saber y censar que aves tienes en tu jardín.

¡Buen día pajarero!

Chincol

Zonotrichia capensis chilensis

Sabiduría Popular: "Cuando canta un Chincol cerca de la entrada de una casa, anuncia la llegada de una carta o una visita de buenos sentimientos (Chiloé). "Si un Chincol o pochoco llega a gritar a la casa, va a llover" (Caguach, Chiloé); "Si un Chincol viene a gritar a la casa a medianoche, habrá buen tiempo" (Quenac, Chiloé)

Su distribución en Chile es desde Atacama a las Islas Guaitecas.

Era llamado por los Mapuche Menkutoki. Tiene una longitud de entre 14 a 16 cm. Cabeza gris con 3 líneas a cada lado que van desde el pico en dirección a la nuca. Plumas de la corona eréctiles. Presenta un ancho anillo castaño rufo alrededor del cuello dándole un aspecto de bufanda. Partes superiores café con estriado negruzco e inferiores blanquecinas con el pecho lavado de grisáceo. Alas gris oscuras con dos bandas transversales blancas. Cola parda oscura. Pico y patas color cuerno.

La hembra es similar pero las plumas de la corona no son eréctiles. Tanto urbano como rural. Básicamente insectívoro, complementa su dieta con semillas y aún restos de cocina.

Su característico canto, compuesto por 4 notas que se repiten, lo hacen fácilmente identificable.

El juvenil es de color café grisáceo intensamente jaspeado y sin el tono rojizo del cuello. Pecho café terroso muy vermiculado longitudinalmente.

Anida de septiembre en adelante, 2 o 3 veces cada temporada. Construye un nido tipo taza fabricado con palitos y recubierto interiormente de plumas que ubica en arbustos y árboles, aunque también lo hace en el suelo, escondido entre el pasto. Pone de 3 a 4 huevos de tono verde pálido manchados con pintas o anillos café oscuro o café lila rojizo. Medidas: 20 x 15 mm aproximadamente.

TENCA

Mimus thenca

Sabiduría Popular: Chile: "Cuando la tenca canta con la cola vuelta hacia una casa, sus moradores deben esperar carta o dinero. Si al cantar vuelve hacia la casa la cabeza, está augurando visita"

Endémica. Su distribución en Chile es desde Caldera a Puerto Montt. Su hábitat natural corresponde a los matorrales y zonas boscosas degradadas, campos y laderas agrestes. También en parques y jardines de las ciudades.

La Tenca (Mimus thenca) y su hermoso canto son clasificados en el orden de los Paseriformes y en la familia de los Mímidos. Los Mapuche le dieron el nombre de Trenka. Tiene una longitud de 28 cm. Coloración gris y café terrosa en sus partes superiores y gris cafesosa pálida en las inferiores. Presenta una conspicua ceja blanca. Cola muy larga, parda oscura con una mancha blanca en el borde terminal externo. Pico y patas negros.

Omnívora. Consume insectos y larvas, frugívora, apetece las bayas del Maqui y Litre. Su canto muy variado, tiene la facultad de imitar el de otras aves.

Nidifica en noviembre. Para anidar elige sitios menos ocultos que el Zorzal, pero protegidos por el ramaje. El nido tipo taza, no muy profunda, lo fabrica de ramas espinosas forrándolo de pasto, musgo, lana o flores secas de espino. Pone 3 huevos, aunque pueden ser 2 o 4, de fondo azulado con pintas entre rojizo y púrpura. Medidas: 40 x 20 mm aproximadamente.

GORRIÓN

Passer domesticus

Este pequeño pájaro común, omnipresente en nuestras ciudades y nuestros campos, ya existía en tiempos de los romanos, que lo asociaron a divinidades protectoras y domésticas de su hogar y de sus alacenas, sin duda porque protegía nuestras comidas de los insectos.

Se encuentra en todo Chile

Ave originaria de Europa. Intruducida en 1904, se propagó con gran rapidez, y en algunos años ya poblaba en abundancia la zona central. Hoy habita en todo el territorio y em islas donde ha sido llevado.

Prefiere los lugares poblados por el hombre. Similar al chincol, aunque de cuerpo más macizo, los machos tienen una notoria mancha negra al centro de la garganta, la hembra es menos robusta que el macho y de tonos pardos más parejos. Anida en cualquier parte que le ofrezca protección, cómo entretechos, aleros, grietas de muros, etc. Muchas veces ocupa nidos ajenos de golondrinas o chercánes.

Anida en cualquir parte que le ofrezca protección. Aprovecha aleros estrechos de casas, establos u otra construcción similar, muchas veces desalojando otras aves como golondrinas o chercánes, para hacer su nido. A falta de estos lugares también nidifica en salientes de roca, grietas de muros o grupos de hojas secas de los árboles. Suele poner entre 3 a 7 huevos.

Loica

Sturnella loyca

Sabiduría Popular: Según el pueblo Mapuche "es un ave sanadora que al igual que la Machi trae sus medicinas de las plantas del bosque para curar su herido pecho rojo". En el campo chileno se dice que su incansable canto acusa y apunta que la mancha roja de su pecho se debe a una herida causada traicioneramente a mansalva con un cuchillo: "con cuchillo fue, con cuchillo fue" (Chile Central)

Su distribución en Chile es desde Atacama hasta Magallanes.

Fácil de identificar por su gran mancha roja en la parte delantera, la Loica (Sturnella loyca) pertenece a la familia de los Ictéridos. Asociada a ambientes rurales, era conocida por los Mapuche como Loyka. Su longitud es cercana a los 26 cm. Partes superiores café con estrías más oscuras. Cabeza negra con notoria banda superciliar blanca sobre el ojo y roja cerca del pico. Garganta, pecho y parte superior del abdomen de color rojo intenso. Resto de las partes inferiores pardo oscuro con rayado grisáceo. Alas café variegadas con pardo oscuro y las coberteras blancas.

La hembra carece del rojo escarlata del pecho del macho, presentando un rojo pálido y siendo de tonalidad general más apagada, con la línea sobre el ojo totalmente blanca. Busca su alimento en terrenos bajos y húmedos, ya sea en el suelo como en los matorrales. Consume semillas, frutas, crustáceos e insectos terrestres.

Nidifica entre septiembre y noviembre. Anida en el suelo de praderas abiertas. Su nido, tipo taza, está hecho de pasto seco bien unido. Pone 3, a veces 4, huevos de fondo gris o café rosado muy claro salpicado con pintas café rojizas, negras y ocres. Medidas: 30 x 20 mm aproximadamente.

Chercán

Troglodytes aedon chilensis



Sabiduría Popular: En el pueblo Lafkenche "llaman Charkanas a la gente que es buena para conversar o las mujeres chismosas, que tienen por costumbre comentar sobre la vida de los otros más que de la propia", aludiendo a su costumbre de cantar y emitir distintas vocalizaciones durante todo el curso del día. También denominan Charkan al plato que preparan las mujeres de ese pueblo, con poñü o papas (Solanum tuberosum) y kollof o cochayuyo (Macrocystis pyrifera), perecido al que denominamos Charquican, porque queda del mismo color que el pajarito.

Su distribución en Chile es desde Atacama hasta Cabo de Hornos.

el Chercán (Troglodytes aedon) es catalogado en la familia de los Troglodítidos, una de las tantas del orden de los Paseriformes. Los Mapuche lo llamaban Chedkan. Tiene una longitud de 12 cm. Partes superiores café canela claro e inferiores de tono blanquecino con tinte amarillento. Subcaudales canela rufo. Alas color café con tono rojizo con las primarias y secundarias barreadas de café amarillento. Cola café parda rojiza con finas bandas transversales negras. Pico fino de color cuerno. Patas del mismo color.

Bullicioso y muy activo, es posible observarlo tanto entre el follaje de los matorrales o árboles como en el suelo, siempre en busca de insectos.

En los jardines es un ávido devorador de pulgones. Su cola erecta y su áspero grito, muy fuerte para su pequeño tamaño, lo hacen inconfundible.

Nidifica desde agosto en adelante y hasta con cuatro posturas al año. Su voluminoso nido de palitos, ramas y fibras vegetales, revestido interiormente con un colchón de plumas finas, lo coloca en cualquier sitio que estime protegido (aleros, matorrales, tejados, buzones, cajas para anidar u oquedades).

Pone 4 a 7 huevos de fondo rosado muy manchados con tonos rojos a café oscuros. Medidas: 17 x 13 mm aproximadamente.

Zorzal

Turdus falklandii magellanicus

Sabiduría Popular: Se dice que su canto expresa la frase "Bendito y alabado sea Dios" (San Juan de Chadmo, Chiloé). Los Yaganes creen que el Hakasir "es ejemplo de la preocupación y dedicación cómo las madres deben alimentar y educar a sus hijos, ellas educan al hermano mayor para que las ayude a criar a los más chicos"

Su distribución en Chile es desde Atacama a Tierra del Fuego. También en las islas de Juan Fernández..

El Zorzal (Turdus falcklandii) pertenece a la familia de los Túrdidos. Los Mapuche lo llamaban Wilki. Tiene una longitud de 26 cm. Partes superiores gris oscuras con tinte oliváceo. Cabeza negra con las plumas de la frente marginadas de café claro. Garganta parda blanquecina con estrías longitudinales negras. Abdomen y pecho amarillento grisáceo con las subcaudales blanquecinas. Alas y cola negruzcas. Pico y patas amarillas. Ojo oscuro con los párpados amarillos. Bastante activo, observándosele frecuentemente en busca de alimento en el suelo, con su clásica postura erguida. Sus presas son lombrices, insectos y otros invertebrados como caracoles de jardín. También consume bayas silvestres como Maqui o Murta y frutas como nísperos, uvas o cerezas. Imita el canto de otras aves. Su áspero trino de alarma suele escucharse durante todo el día.

El juvenil tiene las partes negras son reemplazadas por café. El vientre presenta un moteado negruzco. Pico y patas café claros.

Anida de septiembre a octubre con 2 o 3 puestas al año. Su gran nido, tipo taza, de ramas pegadas con barro y forradas de pasto seco y plumas lo esconde entre el follaje de los árboles. Pone 2 o 4 huevos azul verdoso con gran cantidad de pintas café rojizas. Medidas: 32 x 24 mm aproximadamente.

Jilguero

Sporagra barbata

Sabiduría Popular: Chile: "Cuando se baña en invierno, no tarda en caer la lluvia"
Interesante: En el pueblo Yagán se dice que, "Son descendientes de jóvenes mujeres que gritan su canto en coro volando felices y contentas porque fueron por fín liberadas del gigante con cuerpo de piedra que las tenía prisioneras" (Isla Hoste)

Su distribución en Chile es desde Copiapó hasta Tierra del Fuego.

El Jilguero (Spoarga barbata) pertenece a la familia de los Fringílidos. Los Mapuche lo llamaron Quechán. Tiene una longitud de 13,5 cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene la corona, centro de la garganta y parte del cuello de color negro. Dorso amarillo verdoso oscuro rayado longitudinalmente de negruzco. Auriculares gris cafesosas y lomo amarillento oliváceo claro. Partes inferiores amarillo verdoso con el centro de abdomen blanquecino. Alas con rémiges negras y mancha amarilla en la base de las primarias y secundarias. Coberteras oscuras con punta amarilla formando dos líneas de ese color, muy notoria en vuelo.

La hembra no tiene la corona y el mentón negro. Partes inferiores menos amarillentas y más verdosas.

Nunca en bandadas tan grandes como el Chirihue, cuyo canto resulta menos melodioso.

Se alimenta en el suelo y el follaje. Su dieta está constituida principalmente por semillas, insectos y brotes.

Su nido, tipo taza abierta lo ubica en la bifurcación de ramas de árboles -a veces frutales- a poca altura. Está fabricado con pastos, musgos, palos o fibras y forrado interiormente con plumas o lanas.

Coloca de 3 a 6 huevos blancos con ligero tono celeste liso y a veces con insinuaciones de pintas finas de tono café. Medidas: 18 x 13 mm aproximadamente.

Rara

Sporagra barbata

Su distribución en Chile es desde Atacama hasta Magallanes.

Otra de las familias del orden de los Paseriformes es la de los Cotíngidos. A ésta pertenece la Rara (Phytotoma rara), a la que los Mapuche nombraban por Kamtrü. Tiene una longitud de 19 cm. El Macho presenta la frente y corona rufo castaño, esta última a veces con estrías negras. Lados de la cabeza, cuello trasero y dorso pardo claro rayado de café negruzco. Partes inferiores rufo anaranjado con el abdomen más pálido llegando al rufo acanelado en las subcaudales. Alas negruzcas con bandas blancas formadas por las puntas de las coberteras medianas y por los bordes externos de las primarias exteriores. Cola con las rectrices centrales café oscuro y rufo castaño con amplia banda terminal negra. Pico ancho y alto. Iris rojo. La Hembra tiene las partes superiores café oliváceas con estrías café negruzcas. Alas negruzcas con dos delgadas barras café amarillentas. Mentón, garganta y resto de las partes inferiores café amarillento, estas últimas rayadas de café oscuro en el pecho y flancos. Cola, pico e iris igual al macho.

Frecuentemente en parejas. Se le puede observar parada en la parte alta de los arbustos alimentándose de frutos, brotes y yemas que corta con los bordes mellados de su pico.

Anida de octubre a diciembre, en las bifurcaciones de árboles o arbustos. El nido lo hace a base de fibras de raíces o ramas gruesas en el exterior y ramitas finas y hojas en el interior. Pone de 2 a 4 huevos verde azulados con manchas negruzcas hacia el polo obtuso. Medidas: 25 x 19 mm aproximadamente.

Picaflor gigante

Patagona gigas gigas



Sabiduría Popular: "Cuando una mujer no logra quedar esperando guagua, debe atrapar un picaflor, acariciarlo con sus manos y soltarlo enseguida, así ella recibirá la dicha de engendrar" (Chiloé)

Interesante: Puede haber sido esta especie la que inspiró el gran jeroglífico del Colibrí de Nazca en el Sur del Perú, jeroglíficos de animales que por su gran tamaño se dice que fueron hechos para ser vistos desde el cielo bien por los Dioses o por extraterrestres, pues el ser humano en esa época de la historia, al menos físicamente, todavía no lograba remontar los cielos

Su distribución en Chile es desde Atacama a Arauco.

Perteneciente al orden de los Apodiformes y a la familia de los Troquílidos, el Picaflor gigante (Patagona gigas) mide 24 cm y es llamado también Pinguera. Presenta dimorfismo sexual, siendo el macho de mayor tamaño que la hembra. Las partes superiores son de color gris oliváceo con brillo metálico, siendo más pardo y pálido por debajo. El lomo es blanco, a veces muy manchado del color del manto y el pico es largo y recto. La sub especie P. g. peruviana es ventralmente de color rojo ladrillo. Aletea muy lento cuando se estaciona en el aire. En vuelo de traslación describe un sube y baja muy rápido, intercalando aleteos y desplazamientos

Vive en terrenos arbolados o en ambientes semiáridos. El macho es agresivo y territorial.

Migratorio, llega en julio y se retira en mayo. La subespecie que llega a nuestra zona tiene una marcada predilección por las flores del Chagual (Puya sp). Continuamente lanza silbidos cortos y estridentes.

Nidifica entre finales de octubre y noviembre. El nido está hecho de musgos y líquenes y forrados con un material blando como lana de ovejas.

Coloca uno o dos huevos. Medidas de 21x13 milímetros aproximadamente.

PICAFLOR

Sephanoides sephanoides

Interesante: El pueblo Yagán atribuye gran sabiduría, valentía y autoridad a la Omora que es esta pequeña ave, a la que consideran su protectora y le dan autoría en la gestación de los cursos de agua para que el hombre y los animales tengan del vital elemento para subsistir

Su distribución en Chile es desde Atacama hasta Tierra del fuego.

Perteneciente a la familia de los Troquílidos, el Picaflor (Sephanoides sephanoides) era llamado por los Mapuche Pinda. Su longitud es de 11 cm. De color verde metálico con brillo bronceado en la parte superior. Por debajo es verde grisáceo con los flancos verde bronceado. Cabeza con la frente y corona con escudo rojo anaranjado iridiscente en el macho, muy notable, y una mancha postocular blanca.

La hembra es más pequeña y carece de la iridiscencia en la parte superior de la cabeza que es del mismo color del dorso.

Ave sumamente activa, de vuelo rápido y estacionario cuando se alimenta succionando néctar desde determinadas flores tanto en la ciudad como en sectores rurales. El Notro (Emborthirium ceoccineum) y el Chilco (Fuschia magellanica) están entre sus preferidas dentro de las nativas. Tiene la peculiar aptitud de la hibernación, de gran importancia en la economía de energía en aves de tan altísimo metabolismo.

Anida entre octubre y noviembre. Nidifica bajo denso follaje. Su nido, de admirable factura, cuelga a baja altura de ramas o lianas y lo fabrica de musgo, ramitas y hojas. Pone 2 huevos blancos de forma cilíndrica o a veces oblonga. Medidas: 15 x 9 mm aproximadamente.

Tordo

Curaeus curaeus curaeus

Sabiduría Popular: Según los Huilliches, "Si los cantos del Küreu son melodiosos o si atraviesa en el camino y grita suavemente, las diligencias andarán muy bien" (Chiloé). Para los Yaganes cuando el Tordo baja desde las montañas a la costa es porque vendrán nevazones o ha nevado mucho en el monte (Isla Navarino)

Su distribución en Chile es desde Atacama al Estrecho de Magallanes.

El Tordo (Curaeus curaeus), llamado por los Mapuche Kureu, pertenece al orden de los Paseriformes y a la familia de los Ictéridos. Tiene una longitud de 28 cm. Totalmente negro aterciopelado brillante. Patas y pico aguzado de color negro. Avistado en quebradas arbustivas, casi siempre en bandadas. También volando sobre la ciudad. Bullicioso. Bastante omnívoro en sus preferencias alimenticias, no desdeña saquear el nido de otras aves. En la temporada reproductiva suele reunirse en parejas.

El juvenil es pardo negruzco con el pico más corto y menos aguzado que en el adulto.

Nidifica entre octubre y noviembre. Oculta su nido en lo más espeso de matorrales densos en quebradas lejanas de difícil acceso. Raramente o nunca anida en las ciudades. Pone entre 4 y 5 -excepcionalmente 3 y 6 – huevos alargados y de tonalidad entre azul celeste pálido y azulino con algunas manchas o finos dibujos de color negro. Medidas: 31 x 21 mm aproximadamente.

Su distribución en Chile es desde Atacama hasta Aisén.

El amarillo Chirihue (Sicalis luteola) es uno de los representantes de la familia de los Tráupidos. Los Mapuche lo llaman Chüdüf. Tiene una Longitud de 14,5 cm. Partes superiores oliváceas con estrías café negruzcas en el lomo. Supracaudales amarillo verdoso. Cabeza gris verdosa con las auriculares grisáceas. Partes inferiores amarillas con tinte grisáceo en el pecho y flancos. Subcaudales blanquecinas y primarias negruzcas con ribete verdoso en la barba exterior. Coberteras de tono pardo negruzco con bordes grisáceos y amarillentos. Cola café oscura. La hembra presenta las partes inferiores más grisáceas y menos amarillas. Siempre en grandes bandadas.

Tiene la característica de cantar mientras vuela. Bullicioso en la época nupcial, cuando el macho es fácilmente avistado mientras despliega sus maniobras de vuelo, ascendiendo en graduados planeos casi suspendido en el aire. Su alimentación es fundamentalmente granívora.

Nidifica de septiembre a marzo. El nido, ubicado en el suelo entre los herbazales, está hecho de pastos y forrado con crin de animales. Pone de 3 a 5 huevos azulosos con pintas rufas, a veces formando un anillo en la parte más ancha. Medidas: 19 x 14 mm aproximadamente

Cachudito

Anairetes parulus parulus

Interesante: Junto al Picaflor Chico se trata de la avecilla más pequeña de los bosques templados de Sudamérica Austral, las únicas que pesan menos de 10 gramos. Los Yaganes utilizan el mismo nombre de Sámakéär para ambas especies

Su distribución en Chile es desde Atacama a Magallanes.

El Cachudito (Anairetes parulus), otro representante del orden de los Paseriformes y la familia de los Tiránidos, era llamado por los Mapuche Peskintún. De longitud de 11 cm. Cabeza negra y estriada longitudinalmente de blanco con notorio mechón de plumas negras que nacen de la corona. Dorso gris ahumado oscuro con tinte oliváceo en el lomo. Superficie ventral amarillenta con notorio estriado longitudinal negro, especialmente en la garganta y pecho. Alas negruzcas con bordes blancos en las secundarias exteriores. Cola gris oscura con la barba externa de las rectrices laterales claras, casi blancas. Pico y patas negras. Iris amarillo pálido.

Una de las aves más pequeñas del país. De movimientos rápidos y ágiles, se le puede observar entre los árboles o matorrales en busca de insectos.

Nidifica ente octubre y diciembre. Su nido tipo taza, hecho de líquenes, ramas y hebras de pasto, está cuidadosamente trabajado y revestido interiormente de plumas, situado en árboles a 1,5 o 2 m del suelo. Una notable característica es que a medida que el pollo crece va agrandando la cavidad de su nido. Pone 3 huevos crema amarillento. Medidas: 15 x 12 mm.

Diucón

Xolmis pyrope

Sabiduría Popular: Chile: El canto del Diucón remeda los goterones o nubadas. Por eso las comunidades Lafkenches asocian este canto con la venida de chubascos repentinos y locales (Lago Budi). Para las comunidades Huilliches "cuando el Diucón se eleva desde una rama y se deja caer sobre la misma rama, es porque está anunciando el mal tiempo" (Chequián, Chanquín y Huentemó, Chiloé). Para estas comunidades el Diucón tiene poderes y es un buen chamán que acompaña a los caminantes por el bosque, observándolos y cuidándolos desde las copas de los árboles o arbustos. Los Yaganes dicen "que al Diucón hay que tratarlo bien porque es un chamán poderoso, si uno le tira piedras sobrevienen tormentas y temporales de viento Sur". En Chiloé se piensa, "que con sus insistentes picotazos a los cristales y su grito monótono, quiere indicar que muy pronto, un galán se llevará del hogar a la niña casadera." (Dr. Bernardo Quintana Mansilla, Chiloé Mitológico).

Su distribución en Chile es desde Copiapo hasta Tierra del Fuego.

Dentro del orden de los Paseriformes, la de los Tiránidos es una de sus múltiples familias. El majestuoso Diucón (Xolmis pyrope) o Hurco (püdco) como lo llamaban los Mapuche es uno de sus representantes. El Diucón tiene una longitud de 21 cm. Partes superiores gris oscuro con las primarias y secundarias casi negras con bordes blancos. Coberteras gris oscuras y pecho gris pálido. Abdomen y subcaudales blanquecinas. Garganta blanca. Cola gris presentando el borde externo de las rectrices laterales de color blanco. Pico y patas negros. Iris notable, de color rojo que contrasta con el gris uniforme de su cuerpo.

Siempre solitario, silencioso y poco común. Fundamentalmente insectívoro, consume también frutos silvestres y estados larvales de insectos.

El espécimen juvenil presenta el iris de color castaño.

Nidifica entre octubre y diciembre. El nido tipo taza construido de ramitas, briznas de hierbas, musgo o líquenes y forrado de lana o musgo lo coloca en árboles o arbustos a 2 o 3 m del suelo. Anida también en jardines, pinos y aún en casas. Pone 2 o 3 huevos de fondo blanco algo cremoso con pintas rojizas. Medidas: 25 x 18 mm aproximadamente.

Carpinterito

Veniliornis lignarius

Interesante: Existe la leyenda del pueblo Mapuche que dice que, "Este pájaro carpintero guarda un profundo secreto que celosamente comparte con los renil (Sabios y Sacerdotes Mapuches): la planta que disuelve la piedra y el hierro".

Su distribución en Chile es desde Coquimbo hasta Magallanes

Especie poco abundante, habita en árboles, prados, faldeos, huertos y plantaciones. Muy facil de reconocer por sus colores, especialmente por la nuca roja del macho. Se alimenta de gusanos, larvas e insectos que recolecta buscando entre grietas de toncos o taladrando los troncos de árboles podridos. Mide 19 centímetros.

Es un ave que vive mayormente solitaria o en pareja, diurna, arborícola, de estratos medios a altos de los jardines y bosques. Mientras mantiene su cola apoyada en la corteza, recorre el tronco en busca de insectos. Marca su territorio con llamados agudos y golpeteos en troncos huecos. Su vuelo es ondulado y lento.

Nidifica en huecos que horada en los árboles, donde coloca huevos de color blanco.